

# ไข้ดำแดง

Streptococcal scarlet fever



มีไข้ เจ็บคอ



ปวดศีรษะ อ่อนเพลีย



คลื่นไส้อาเจียน




อาการ

ผื่นที่บริเวณคอ และกระจายไป  
ตามตัว แขน ขา และข้อพับ



ต่อมทอนซิลบวม แดง อาจมีเชื้อสีขาว  
เทา หรือเหลืองปกคลุม



ลิ้นมีสีแดงและมีตุ่มสีนํ้าขี้ด



## การติดต่อ

แพร่กระจายจากคนสู่คน ผ่านทางละอองฝอยจากสิ่งคัดหลั่งของผู้ป่วยได้แก่ เสนหะ น้ำมูก น้ำลาย จากการหายใจ และการสัมผัสทางเยื่อเมือกต่างๆได้แก่ ตา จมูก ปาก รวมทั้งการสัมผัสใกล้ชิดผ่านทางสิ่งของใช้ร่วมกัน เช่น แก้วน้ำ ช้อน

## ภาวะแทรกซ้อน

- ผื่นที่บริเวณรอบต่อมทอนซิล
- ไชนิสอักเสบ
- ปอดอักเสบ
- เยื่อหุ้มสมองอักเสบ
- ไช้รูมาติก
- ไตอักเสบ

## การวินิจฉัย

อาศัยอาการแสดงข้างต้น และอาจ  
ตรวจยืนยันเชื้อจากการเพาะเชื้อ  
จากลำคอหรือการตรวจเลือด

## การรักษา

การรักษาที่สำคัญคือ ยาฆ่าเชื้อแบคทีเรีย  
ได้แก่ penicillin หรือ erythromycin  
เป็นระยะเวลา 10 วัน ร่วมกับการรักษา  
ตามอาการเช่น ยาลดไข้ อาการไอน้ำ  
จะลดลงภายใน 12-24 ชั่วโมงหลังได้รับ  
ยาฆ่าเชื้อ

**การพบแพทย์** เพื่อการวินิจฉัยและการรักษาที่ถูกต้อง ตั้งแต่ระยะเริ่มแรกจะช่วยควบคุมความรุนแรงของโรคได้ และการดูแลสุขอนามัยในทุกคนอย่างสม่ำเสมอ จะสามารถช่วยลดการแพร่กระจายของโรคได้

แฮร์โด้ซัวร์



ชมรมทันตแพทย์ไทย โทร 02-554-3222  
หรือ แฮร์โด้ซัวร์ไทยแลนด์  
คลิกเมนู QR Code



ชมรมทันตแพทย์ไทย



ชมรมทันตแพทย์ไทย

แพทย์หญิงศิริณา อ่อนจรรยา  
สถาบันโรคผิวหนัง